

ZIUA MONDIALĂ DE LUPTĂ ÎMPOTRIVA HEPATITEI

Find The **Missing** Millions.

28 iulie 2019 ELIMINAREA HEPATITEI



HEPATITA VIRALĂ este o problemă de sănătate publică la nivel mondial

- Hepatitele B și Cucid anual 1,34 milioane de persoane, mai mult decât HIV/SIDA, tuberculoza sau malariala.
- Hepatitele B și C sunt responsabile pentru 2 din 3 decese cauzate de cancerul hepatic.
- >290 de milioane de oameni trăiesc fără să știe cu hepatita virală.
- Costul dozei de vaccin la naștere este de 20 de cenți (USD), cu toate acestea, încă nu este folosit în 48% din țările lumii.
- Eliminarea hepatitei B și hepatitei C, ca amenințări la adresa sănătății publice, până în anul 2030 ar preveni aproximativ 36 de milioane de infecții și ar salva 10 milioane de vieți.
- Din cele 325 de milioane de oameni care trăiesc cu hepatita virală la nivel global, mai mult de 290 de milioane (9 din 10!) trăiesc fără să știe cu hepatita B sau C. Fără îmbunătățirea semnificativă a diagnosticului, ratele de tratament vor scădea, ratele de infectare vor crește și vom pierde posibilitatea de a elimina hepatita virală până în anul 2030.¹

1. World Hepatitis Alliance (WHA): www.worldhepatitisalliance.org

HEPATITELE VIRALE la nivel european

Hepatita B - în anul 2017 au fost raportate 26907 cazuri, din care:

- acute: 2486 (9%)
- cronice: 15472 (58%)
- necunoscute: 8607 (32%)
- 30% din cazuri au avut vârste cuprinse între 25 și 34 de ani
- 12% din cazurile acute și 9% din cele cronice cu vârsta sub 25 de ani
- raportul bărbați-femei: 1,6 la 1.
- rata generală: 6,7 la 100 000.²

Hepatita C - în anul 2017 au fost raportate 31273 cazuri, din care:

- acute: 861 (3%)
- cronice: 6805 (22%)
- necunoscute: 23311 (75%)
- 49% din cazuri au avut vârste cuprinse între 25 și 44 de ani
- 6% au avut vârsta sub 25 de ani
- raportul bărbați-femei a fost de 2 la 1.
- rata generală: 7,3 la 100 000.²

2. ECDC: Surveillance of hepatitis B and C in the EU/EEA – 2017 data
<http://ecdc.europa.eu/sites/portal/files/documents/hepatitis-B-C-presentation-AER-2017.pptx>

HEPATITELE VIRALE în România, în anul 2018


Hepatitele virale tip B și tip C

- În sistemul național de supraveghere au intrat **241 cazuri** de hepatite virale tip B și C, cu 3 mai multe față de anul precedent (328).
- continuă trendul descendent pentru incidența raportată a hepatitei virale tip B, în paralel cu variații minore, de la un an la altul, pentru hepatita virală tip C.
- au intrat în sistemul național de supraveghere **119 cazuri nou depistate** de hepatită virală tip B, din care 99% în stadiu acut și 1% în stadiu cronic.

Hepatita virală acută tip B mai frecvent raportată pentru grupa de vârstă 35-44 ani la sexul masculin, respectiv 45-54 ani la cel feminin.

Calea de transmitere nosocomială a înregistrat frecvența cea mai ridicată, pentru ambele tipuri de hepatită acută.³

Evolutia incidenței hepatitelor virale tip B și C, în România, în perioada 2006-2018



3. CNSCBT <http://www.cnscbt.ro/index.php/analiza-date-supraveghere/hepatita-virala-tip-b-si-c/1204-hepatita-virala-tip-b-si-c-anul-2018-analiza/file>



MINISTERUL SĂNĂTĂȚII



INSTITUTUL NAȚIONAL DE SĂNĂTATE PUBLICĂ

CNEPSS

CENTRUL NAȚIONAL DE EVALUARE ȘI PROMOVARE A STĂRII DE SĂNĂTATE



CENTRUL REGIONAL DE SĂNĂTATE PUBLICĂ TIMIȘOARA



DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ JUDEȚUL NEAMȚ